

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК [598.272.6:591.5] (470.44/47)

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИРИЙСКОГО ДЯТЛА (*DENDROCOPOS SYRIACUS*) В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

© 2008 г. Е.В. Завьялов¹, В.Г. Табачишин², Е.Ю. Мосолова¹

Проанализированы темпы расселения сирийского дятла на территории Нижнего Поволжья и сопредельных регионов. Восстановлена хронология проникновения вида в нижневолжский регион. Подтверждено достоверными материалами обитание сирийского дятла в настоящее время (2007 г.) в Саратовской области. Прогнозируется дальнейшее расселение данного вида на севере Нижнего Поволжья в северном и северо-восточном направлениях.

Ключевые слова: *Dendrocopos syriacus*, распространение, численность, Нижнее Поволжье.

В ходе антропогенного преобразования среды птицы неизбежно вовлекаются в процессы синантропизации, когда проявляются новые экологические адаптации. Фауна больших и малых населенных пунктов европейской части России постоянно пополняется за счет птиц с высокой экологической пластичностью. К таким видам относится сирийский дятел (*Dendrocopos syriacus* (Hemprich et Ehrenberg, 1833)), изучение трансформации ареала которого актуально на современном этапе. Этот вид на протяжении длительного времени проявляет тенденцию к расселению. С 1890 г. ареал этих птиц за относительно короткий период расширился от первичных областей размножения в Турции на территорию Ливана, Израиля, Балкан и Центральной Европы. В течение первой половины XX в. сирийский дятел заселил значительную территорию Балканского полуострова, появился в странах Восточной Европы [1].

На Украине сирийский дятел был найден в 1948 г. в Черновицком районе, данный вид проявил тенденцию к расселению в восточном направлении от Румынии и Молдовы [2]. Впоследствии занял Центральную Украину [1], затем пересек восточную границу и, в конечном счете, достиг долины Дона в России. В 1980-х гг. дятел уже появился в Ростове-на-Дону, где к настоящему времени стал обычной гнездящейся

птицей [3]. Одновременно сирийский дятел расселялся на юг: появление этих птиц в северном Крыму было отмечено в 1979 г. [4]. В последующий период *D. syriacus* заселил большую часть степного Крыма, а южная граница его распространения проходила в 2004 г. по линии Севастополь–Симферополь–Керчь [5]. К северу на Украине ареал простирался до 51-й параллели [6].

Таким образом, одна из частей репродуктивного ареала вида охватывала в 1990-х гг. страны Восточной Европы и юг европейской части России; изолированная популяция приурочена к Восточному Кавказу. Не известно, было ли расширение ареала в Европе вызвано популяционными трендами, которые зародились на территории Малой Азии. Между тем, западная граница ареала совпадала в тот период с июльской изотермой +18 °С, которая считалась климатическим барьером в дальнейшем распространении вида на запад [1]. Восточная граница ареала сирийского дятла, приведенная А.И. Ивановым [7], приходилась на Черновицкую и Тернопольскую области Украины. По мнению Л.С. Степаняна [6], в тот период сохранялась тенденция к расселению балканской расы на восток, где ареал вида пересек 33-й меридиан.

В конце прошлого столетия в расселении сирийского дятла за пределы Центральной Европы по-прежнему преобладает восточное и северо-восточное направления. В этот период дятел заселил практически всю территорию Украины, появился в Белоруссии. В центральные районы европейской части России сирийский дятел проник несколько позднее. На рубе-

¹ Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, тел. 8 (8452) 51-16-30; e-mail: zavialov@info.sgu.ru.

² Саратовский филиал Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; 410028, Саратов, ул. Рабочая, 24, тел. 8 (8452) 22-81-23; e-mail: hrustovav@forpost.ru.




Рис. 1. Динамика распространения *Dendrocopos syriacus* в Нижнем Поволжье

же столетий он зарегистрирован в Воронежской [8] и Брянской [9] областях, в 2002 г. – в Рязанской [10], в 2004 г. – в Тульской [11]. Летом 2005 г. сирийский дятел обнаружен на гнездовании в окрестностях заповедника «Лес на Ворскле», в поселке Борисовка на юго-западе Белгородской области [12]. В мае 2007 г. вид был встречен в черте г. Москвы [13].

В Нижнем Поволжье проникновение сирийского дятла на гнездование происходило в первой половине 1990-х гг. (рис. 1). Так, на юге Волгоградской области сирийского дятла впервые наблюдали в 1995 г. [14]. Однако уже в следующем полевом сезоне *D. syriacus* здесь регистрировали регулярно [15]. В последующие годы процесс расселения вида в указанном регионе продолжился [16]. В Калмыкии, на севере Ергенинской возвышенности, сирийский дятел впервые был отмечен Г.А. Носковым в сентябре 1993 г. В следующем году одиночную особь зарегистрировали в городском парке г. Элисты. Здесь же в 1996 и 1997 гг. наблюдали одиночного самца *D. syriacus*, а с 1997 г. эти птицы

гнездятся в городском парке. В последующие годы распространение сирийского дятла по территории Калмыкии продолжилось, были выявлены новые очаги его гнездования [17]. Во второй половине 1990-х гг. *D. syriacus* заселяет южную и центральную части Волгоградской области. За период примерно с 1990 по 2002 гг. включительно отмечается заметный (в некоторых районах до 50 %) рост численности дятла в Ростовской области, а также в Краснодарском крае [18].

Первая регистрация сирийского дятла *D. syriacus* в Саратовской области датирована 19.02.2005 г. Одиночная птица наблюдалась в районе старой многоэтажной застройки в Ленинском районе Саратова. Лишь в конце ноября 2007 г. удалось вновь встретить сирийского дятла в области. На этот раз регистрация нескольких особей была приурочена к окрестностям с. Усовка Воскресенского района. Относительная численность сирийского дятла на садовых участках вблизи места впадения р. Терешки в р. Волгу в ходе одного маршрутного учета, про-

веденного 25.11.2007 г., составила 0,73 особи на 1 км маршрута. На основе современных наблюдений мы склонны предполагать существование стабильной популяции сирийского дятла в пределах Саратовской области.

Прямой связи с динамикой климатических показателей в отношении начального периода расселения сирийского дятла выявить не удается. Однако проявляющиеся климатические тренды, в частности климатические колебания разного масштаба, все же могут служить своеобразными пусковыми механизмами этого процесса [19]. В отношении объективных причин расширения ареала дятла дать однозначный ответ достаточно сложно. В качестве таковых может считаться антропогенное изменение среды, при котором происходит «снятие» экологических преград, заселение постледникового фаунистического «вакуума», расселение как проявление пульсаций векового масштаба или заселение еще не полностью освоенного потенциала ареала. Кроме того, может рассматриваться гипотеза динамики расселения на основе эндогенно обусловленных изменений территориальных связей птиц и трансформации их ареалов. Однако большая часть их носит пока лишь гипотетический характер.

Таким образом, склонность сирийского дятла к синантропизации позволяет прогнозировать дальнейший рост его численности и распространение на севере Нижнего Поволжья и в европейской части России в целом. Восточным рубежом на современном этапе в расселении *D. syriacus* является долина Волги. Процесс расширения ареала будет происходить преимущественно в северном и северо-восточном направлениях. Он не ограничивается сколько-нибудь выраженными факторами биотического или абиотического характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Munteanu D., Samwald O. Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* // The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London: T & A.D. Poyser Ltd, 1997. P. 450–451.
2. Страутман Ф.И. Птицы Советских Карпат. Киев: Изд-во АН УССР, 1954. 332 с.
3. Савицкий Р.М., Лебедева Н.В., Савицкая Н.А. Видовой состав и динамика разнообразия птиц в городе Ростове-на-Дону // Кавказ. орнитол. вестн. 1998. Вып. 10. С. 114–123.
4. Костин Ю.В. Птицы Крыма. М.: Наука, 1983. 242 с.
5. Цвелых А.Н. Расселение сирийского дятла (*Dendrocopos syriacus*) в Крыму // Бранта. 2005. Вып. 8. С. 198–199.
6. Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области). М.: Академкнига, 2003. 808 с.
7. Иванов А.И. Каталог птиц СССР. Л.: Наука, 1976. 276 с.
8. Барышников Н.Д. Сирийский дятел – новый гнездящийся вид Воронежской области // Орнитология. 2001. Вып. 29. С. 282.
9. Косенко С.М. Гнездование сирийского дятла в Брянской области // Орнитология. 1998. Вып. 28. С. 226.
10. Иванчев В.П., Назаров И.П. О некоторых авифаунистических находках в 2002 году в Окском заповеднике и Рязанской области // Тр. Окского заповедника. 2003. Вып. 22. С. 675–678.
11. Архипов В.Ю., Хедберг Т. Встреча сирийского дятла *Dendrocopos syriacus* в Поленово (Тульская область) // Рус. орнитол. журн. 2004. № 268. С. 701–702.
12. Бардин А.В. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* гнездится в окрестностях «Леса на Ворскле» // Рус. орнитол. журн. 2005. Т. 14. № 291. С. 554–556.
13. Ковалев К.И. Первая встреча сирийского дятла в Москве // Московка: Новости программы «Птицы Москвы и Подмосковья». 2007. Вып. 6. С. 5.
14. Завьялов Е.В., Альберти Л.Г. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* в Волгоградской области // Рус. орнитол. журн. 1996. Т. 5. № 1. С. 3–4.
15. Завьялов Е.В., Капанова Т.А., Альберти Л.Г. Характеристика зимнего населения птиц юга Волгоградской области // Кавказ. орнитол. вестн. 1996. Вып. 8. С. 11–14.
16. Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н., Лобачев Ю.Ю., Мосолова Е.Ю. Генезис природных условий и основные направления современной динамики ареалов животных на севере Нижнего Поволжья. Сообщение IX. Прогноз долговременных тенденций в динамике распространения птиц // Поволж. экол. журн. 2004. № 3. С. 252–276.
17. Кукиш А.И., Музаев В.М. Сирийский дятел – новый гнездящийся в Калмыкии вид // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии: Материалы Междунар. конф. (XI орнитол. конф.). Казань: Изд-во «Матбугат йорты», 2001. С. 341–342.
18. Белик В.П., Поливанов В.М., Тильба П.А., Джамирзоев Г.С., Музаев В.М., Букреева О.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Мосейкин В.Н., Чернобай В.Ф., Хохлов А.Н., Ильях М.П., Мнацеканов Р.А., Комаров Ю.Е. Современные популяционные тренды гнездящихся птиц Южной России // Стрепет. 2003. Вып. 1. С. 10–30.
19. Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Мосолова Е.Ю. Динамика распространения и современная численность степного (*Melanocorypha calandra*) и белокрылого (*Melanocorypha leucoptera*) жаворонков на севере Нижнего Поволжья // Поволж. экол. журн. 2007. № 4. С. 297–309.

**DISTRIBUTION DYNAMICS OF SYRIAN WOODPECKER
(*DENDROCOPOS SYRIACUS*)
IN THE LOWER-VOLGA REGION**

E.V. Zaviyalov, V.G. Tabachishin, E.Yu. Mosolova

The expansion rate of *Dendrocopos syriacus* over the Lower-Volga Region and adjacent territories is analyzed. The chronology of the species' penetration into the Region has been restored. Habitation of *D. syriacus* in the Saratov Region at present (2007) is confirmed by authentic materials. Further moving of the species in the northern Lower-Volga region northward and northeastward is predicted.

Key words: *Dendrocopos syriacus*, distribution, number, Lower-Volga Region.

REFERENCES

1. Munteanu D., Samwald O. 1997. Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus*. *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and abundance*. London, T & A D Poyser Ltd: 450–451.
2. Strautman F.I. 1954. *Ptitsy Sovetskikh Karpat*. [*Birds Soviet Carpathians*]. Kiev, Ukrainian Academy of Sciences: 332 p. (In Russian).
3. Savitskiy R.M., Lebedeva N.V., Savitskaya N.A. 1998. [Species composition and dynamics of the diversity of birds in the city of Rostov-on-Don]. *Kavkazskiy ornitologicheskiy vestnik*. (10): 114–123. (In Russian).
4. Kostin Yu.V. 1983. *Ptitsy Kryma*. [*Birds Crimea*]. Moscow, Nauka Publ.: 242 p. (In Russian).
5. Tsvelykh A.N. 2005. [Settling Syrian woodpecker (*Dendrocopos syriacus*) in Crimeay]. *Branta*. (8): 198–199. (In Russian).
6. Stepanyan L.S. 2003. *Konspekt ornitologicheskoy fauny Rossii i sopredel'nykh territoriy (v granitsakh SSSR kak istoricheskoy oblasti)*. [*Summary of the ornithological fauna of Russia and adjacent territories (within the borders of the USSR as a historical area)*]. Moscow, Akademkniga Publ.: 808 p. (In Russian).
7. Ivanov A.I. 1976. *Katalog ptits SSSR*. [*Catalog birds of the USSR*]. Leningrad, Nauka Publ.: 276 p. (In Russian).
8. Baryshnikov N.D. 2001. [Syrian Woodpecker is a new breeding species Voronezh Region]. *Ornitologiya*. (29): 282. (In Russian).
9. Kosenko S.M. 1998. [Breeding Syrian woodpecker in Bryansk region]. *Ornitologiya*. (28): 226. (In Russian).
10. Ivanchev V.P., Nazarov I.P. 2003. [Some other faunal findings in 2002 in the Oka Reserve and the Ryazan region]. In: *Trudy Okskogo zapovednika*. [*Proceedings of the Oka Reserve*]. (22): 675–678. (In Russian).
11. Arkhipov V.Yu., Khedberg T. 2004. [The meeting of the Syrian woodpecker *Dendrocopos syriacus* in Polenovo (Tula Region)]. *Russkiy ornitologicheskiy zhurnal*. (268): 701–702. (In Russian).
12. Bardin A.V. 2005. [Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* nests in the vicinity of “Forest on the Vorskla”]. *Russkiy ornitologicheskiy zhurnal*. 14(291): 554–556. (In Russian).
13. Kovalev K.I. 2007. [The first meeting of the Syrian woodpecker in Moscow]. In: *Moskovka: Novosti programmy “Ptitsy Moskvy i Podmoskov'ya”*. [*Moskovka, News program “Birds of Moscow and the Moscow region”*]. Issue 6. P. 5. (In Russian).
14. Zav'yalov E.V., Al'berti L.G. 1996. [Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* in the Volgograd Region]. *Russkiy ornitologicheskiy zhurnal*. 5(1): 3–4. (In Russian).
15. Zav'yalov E.V., Kapranova T.A., Al'berti L.G. 1996. [Characteristics of the winter bird population of the south of the Volgograd Region]. *Kavkazskiy ornitologicheskiy vestnik*. (8): 11–14. (In Russian).
16. Zav'yalov E.V., Shlyakhtin G.V., Tabachishin V.G., Yakushev N.N., Lobachev Yu.Yu., Mosolova E.Yu. 2004. [Genesis of natural conditions and basic directions of the modern dynamics of animal habitats in the north of the Lower Volga region. Report IX. Prediction of long-term trends in bird distribution]. *Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal*. (3): 252–276. (In Russian).
17. Kukish A.I., Muzaev V.M. 2001. [Syrian Woodpecker, a new species breeding in Kalmykia]. In: *Aktual'nye problemy izucheniya i okhrany ptits Vostochnoy Evropy i Severnoy Azii. Materialy Mezhdunar. konf. (XI ornitol. konf.)*. [*Actual problems of the study and protection of birds in Eastern Europe and Northern Asia. Proceedings of the Intern. conf. (XI ornitol. conf.)*]. Kazan, “Matbugat yorty” Publ.: 341–342. (In Russian).
18. Belik V.P., Polivanov V.M., Til'ba P.A., Dzhamirzoev G.S., Muzaev V.M., Bukreeva O.M., Rusanov G.M., Reutskiy N.D., Moseykin V.N., Chernobay V.F., Khokhlov A.N., Il'yukh M.P., Mnatsekanov R.A., Komarov Yu.E. 2003. [Current population trends of breeding birds in South Russia]. *Strepet*. (1): 10–30. (In Russian).
19. Zav'yalov E.V., Tabachishin V.G., Mosolova E.Yu. 2007. [The dynamics of modern distribution and abundance of steppe (*Melanocorypha calandra*) and leucoptera (*Melanocorypha leucoptera*) Lark in the north of the Lower Volga]. *Povolzhskiy ekologicheskiy zhurnal*. (4): 297–309. (In Russian).